中国船东互保协会文件

中船保赔字[2014]11号

关于埃博拉病毒在西非蔓延的警示通函

各会员公司：

近期西非埃博拉病毒（Ebola virus）迅速蔓延，几内亚（Guinea）、利比里亚（Liberia）、塞拉利昂（Sierra Leone）、尼日利亚（Nigeria）四国相继出现确诊和疑似病例，感染人数和死亡人数不断上升，引起了世界各国人民的恐慌。协会已经在官方网站上发布“防损信息2014035号—埃博拉病毒—西非-船舶营运”，但仍有很多会员公司就此问题咨询协会，希望得到更多的信息和帮助。在此，我们结合其他协会出具的类似防损信息，整理出下文供参考，希望能对各会员公司有所帮助。

一、埃博拉病毒及此次疫情简介

埃博拉病毒，又称伊波拉病毒，是一种能引起人类和灵长类动物（猴子、大猩猩和黑猩猩）产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒。该病毒在1976年首次被发现，并以非洲刚果民主共和国（Democratic republic of congo）的

埃博拉河命名，死亡率高达50%至90%，是迄今为止死亡率最高的病毒之一。致死原因主要为中风、心肌梗塞、低血容量休克或多发性器官衰竭。

科学研究表明，埃博拉病毒源起于果蝠，并且可传染给大多数灵长类动物。因此，该病毒一般在西非遥远的丛林地带和区域群落产生和蔓延，而非城市中心。目前国际社会仍然没有研制出埃博拉病毒疫苗，也没有特别的治疗办法，只能医治类似的临床症状。

埃博拉病毒是通过密切接触到感染动物的血液、分泌物（粪便、尿液、唾液和精子）、器官或其它体液而传给人类。任何破损皮肤或粘膜与受到埃博拉病人的感染性液体（如脏衣物、床单或者用过的针头）污染的环境发生接触时，都可能导致病毒感染。病毒不会通过简单的空气接触传播，但在感染风险存在的任何区域内都应当做好严格防范。在进入埃博拉病毒高风险区域前均应当注意确保身体做好妥善防护。另外需减少与高危动物（即果蝠、猴子或猿）的接触，包括不要拾取在森林中发现的死亡动物或处理动物生肉。

根据美国疾病控制中心（CDC）报告公布，感染埃博拉病毒的患者会通常出现突发高热、极度疲乏、肌肉疼痛、头痛等典型症状及体征，随后呕吐、腹泻、皮疹、肝肾衰竭，病情严重的患者会出现内部脏器出血或体表出血。因病理症状较为隐蔽，实验室检查是目前唯一可以确认埃博拉病毒感染的方式。埃博拉病毒的潜伏期是2到21天不等，在潜伏期内不具传染性。但病人一旦开始显现症状，就具有了传染性。

此次埃博拉病毒爆发是自首次发现该病毒以来最为严重的一次，主要波及西非几内亚、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂四个国家，其中以几内亚最

为严重，并且疫情首次超出边远的丛林村庄，蔓延至人口密集的大城市。根据世界卫生组织公布的最新数据显示，西非埃博拉病毒感染病例已经达到1711例，造成932人死亡，死亡率接近55%。

二、建议船员应当采取的措施

建议船员采取以下措施避免在高风险区域感染埃博拉病毒的可能性：

1、勤洗手，时刻保持个人良好卫生；

2、尽量避免与传染区域当地政府官员、代理、装卸工人等人员握手；

3、应当在舷梯或过道处放置水桶和设置包含有氯、水以及肥皂的洗涤间，方便在船人员洗手和消毒。同时类似的洗涤间应当设置在船舶其它明显的位置；

4、防止与当地人员发生直接的身体接触，不论其是否可能被感染；

5、 监测所有船员是否具有感染埃博拉病毒的症状，一旦发现应当立即向船长、当地政府以及协会报告；

6、 船员应当尽可能避免与患病严重人员接触或者与感染人员的血液、体液接触；

7、避免参加需要接触死亡患者尸体的葬礼或埋葬仪式；

8、避免接触动物或生肉；

9、避免去接收埃博拉病毒患者的医院就医。使馆或者当地代理也许能提供船员所需的建议或设施；

10、任何船员发生高烧、头痛、肌肉酸痛、咽喉痛、腹泻、呕吐、胃痛、皮疹或红眼症状时均需及时治疗。

三、建议船东应当采取的措施

1、根据埃博拉病毒的传播特性，指导船员做好抵港前、在港期间、离港后的相应工作。在港期间，强烈建议船东取消任何不必要的船员上岸许可，必要时限制船舶靠岸时间；

2、船东应当避免在病毒爆发国家更换船员；

3、除埃博拉病毒感染外，如果船员要求接受治疗，应当考虑留在船上，直至船舶抵达下一属于非疫区的港口；

4、伙食采购和淡水添加需通过正规渠道，并保障过程中卫生安全。船员应当限制食用或饮用当地产品；

5、船公司应当事先建立应急反应工作小组，制定应急措施，确保船舶发生疫情或疑似病例后能够迅速有效处理，保障船员安全与船舶正常营运。

6、停靠传染国家港口的船舶应当确保完全正确执行安全协议，船员应当格外注意防止偷渡案件的发生。强烈建议在离港前增加检查以及确保在港期间24小时不间断地安全监控。监管人员仅允许与船舶营运要求有关的特定

人员登船，如装卸工人以及官员。如果感染地区人员成功登上船舶进行偷渡，不仅将增加船员感染的风险，同时会导致其他国家拒绝接受偷渡人员，最终安排偷渡人员的遣返和离船将十分困难。

在船舶停靠高风险国家和地区的港口后，船舶需要在停靠前和停靠期间内提供更强的安全保证。船长与船员应做好因当局检查船舶，或调查先前停靠港口环境导致船舶延误的准备。在这种情况下，船长将被严密询问有关船员动态以及停靠港口名单，因此建议船长事先准备好向当局提交的有关船员何时何地登船的资料，包括船员是否在高风险区域上岸等细节。

四、对疑似病患治疗应采取的应急措施

如果船员在相关区域接触已确诊或疑似感染埃博拉病毒的人员，并且出现相关症状，在可能的情况下应当立即进行救治。若在船舶航行途中发现船员有埃博拉病毒症状（高烧、虚弱、肌肉疼痛、头痛、咽喉痛、呕吐、腹泻、出血等），建议采取以下措施：

1、保持感染船员舱室门关闭，除非船上具有可用作医疗隔离的房间；

2、所有进入该舱室的人员应当逐一登记和观察；

3、任何进入隔离区间照顾感染船员或者打扫舱室的人员均应配备以下个人防护装备：

（1）外科手术防护面具以及护目镜或者面罩；

（2）无菌检查用手套或者外科手套；

（3）用于遮盖衣服和暴露在外皮肤的一次性防水服。同时在防水服外穿防水围裙。

4、在离开隔离区域时，个人防护装备应当带出，避免接触污秽物质；

5、必要时限制病人在舱室内活动或进行转移，如果必须转移，病人应当戴上医用面具；

6、禁止使用喷雾或喷剂清除液体，与病人身体或液体接触过的亚麻布、衣服、餐桌布或者其它物体应当单独放置，并按照上述方式消毒，以避免喷雾导致其他人员接触或污染环境；

7、所有隔离舱中产生的废弃物都应当按照船舶医疗废弃物处理协议进行处理。如果船上具有焚烧装置应当进行焚烧处理。如果废弃物必须转移上岸，应当采取特别的预防措施，并在废弃物转交之前向港口相关机构通报情况。

对于任何在船舶上发生疑似感染埃博拉病毒的案件，应当立即寻求专家医疗意见，并且船长应当尽快向下一个停靠港口报告该事件。病人应当在避免接触其他健康人员的情形下下船并且戴防护口罩。在紧急医疗运送期间，与患者接触的人员应当穿戴保护面具和个人防护装备。港口主管部门可能需要安排医疗疏散、登岸特殊安排、病人住院治疗以及实验室检查等。

各会员公司如需了解更多信息，请登陆下列网站查询。

1、世界卫生组织：埃博拉—常见问答（FAQ）

http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/en/

2、世界卫生组织：埃博拉—游客建议

http://www.who.int/ith/updates/20140421/en/

3、世界卫生组织：非洲地区办事处

http://www.afro.who.int/

4、国际疾病预防控制中心

http://www.afro.who.int/

关于此次埃博拉疫情的进展，协会将保持密切关注，并随时以通函或者防损信息的形式发布，请各会员公司知悉。

特此通函。

中国船东互保协会

二〇一四年八月七日

主题词：中船保、埃博拉病毒、 通函

抄送：大连分部、上海分部

中国船东互保协会　　2014 年 8 月 7 日印发